

Verlag excursie Beneden Regge NW van Lemele (226-498 en 227-498) op 2 juli 2022

FWT-FLORON

Jan Meutstege en Otto Zijlstra

Deelnemers: Jan Meutstege, Harry Scheper (1) en Harvey Pearson, Otto Zijlstra (2)

1.

Rond 9.45 uur stonden Harry en ik te wachten op de parkeerplaats langs de N347, niet wetende dat Otto en Harvey op een parkeerplaats aan de andere kant van deze weg stonden. We hebben gewacht tot na tien en zijn met zijn tweeën op pad gegaan. Kilometerhok 227-498 (Archemerbrug) zag er op de kaart interessant genoeg uit voor een bezoek. Om het interessantste deel voor het laatst te bewaren zijn we begonnen in het noordwesten langs de verharde bosweg. Weinig interessante soorten en variëteit. Soorten als Mannetjesvaren (*Dryopteris filix-mas*), Knopig helmkruid (*Scrophularia nodosa*). Wel een mooie wandelomgeving. Bij een boerderette met nagebouwde hooiberg een



prachtig korenveld met veel Korenbloemen (*Centaurea cyanus*). We zijn de brug bij de Regge overgestoken om eerst de oostkant van het bos nog mee te nemen. Deze kant was floristisch gezien interessanter. Hier een daar nog een plukje Struikhei (*Calluna vulgaris*), veel Brem (*Cytisus scoparius*) en een drietal Jeneverbessen (*Juniperus communis*), die in dit hok 40 jaar geleden voor het laatst gemeld waren. Een exemplaar mocht de naam struik niet meer hebben, dat was een boom van zeker 8 meter hoog. Helaas waren de heideterreintjes, die op de kaart ingetekend stonden niet meer te vinden, alles was begroeid met berkjes e.d. In een poel in de Eerder hooilanden aan de rand van het bos een drooggevalen poel met Zwart tandzaad (*Bidens frondosa*), Egelboterbloem (*Ranunculus flammula*) en Gele lis (*Iris pseudacorus*).

De oevers van de Regge, de stuw en de plek waar Regge en Linderbeek samenkomen hadden we bewaard voor na de middag. Helaas waren de oevers van de Regge hermetisch afgesloten met hoog hekwerk. Verderop, op de plek waar de rivier en beek samenkomen wordt hard gewerkt aan natuurherstel. De volledige bovengrond afgeschraapt, nog geen plantje te zien, oevers kort gemaaid en een nieuw kunstwerk middenin het terrein was alles wat we konden zien.

We hebben onze weg vervolgd langs de oostoever van de Linderbeek waar we o.a. Geel walstro (*Galium verum*), Glanzig fonteinkruid (*Potamogeton lucens*), Dag- en Avondkoekoeksbloem (*Silene dioica* en *S. latifolia* subsp. *alba*) en één plant Wede (*Isatis tinctoria*) vonden. De sloot aan de andere kant van de beek was leuker, boordevol Kikkerbeet (*Hydrocharis morsus-ranae*), Kleine egelskop (*Sparganium emersum*), Gewone waterbies (*Eleocharis palustris*), Zompvergeet-mij-nietje (*Myosotis laxa* subsp. *caespitosa*) en Penningkruid (*Lysimachia nummularia*). Tot slot nog enkele wegbermen meegepakt met o.m. Bosandoorn (*Stachys sylvatica*) en uiteindelijk kwamen we tot 203 soorten.



De leukste vondst van de dag was echter geen plant, maar een gigantische dassenburcht. Zo'n 50 ingangen, vele tientallen meters in omtrek en duidelijk bewoond. Enkele vers gegraven ingangen met sporen. (Jan Meutstege)

2.

Harvey en Otto startten vanaf de parkeerplaats aan de Blikweg 200 meter zuidelijk van de plek waar Jan en Harry stonden. Van hieruit staken we de N347 over, om zo in kilometerhok 226-498 (Archemeresch) te komen, een hok met akkertjes en bos en in de uiterste zuidoosthoek niet-toegankelijke lage graslanden langs de Beneden Regge. Aan zandpaden door het bos troffen we naast Valse salie (*Teucrium scorodonia*), plaatselijk veel Hengel (*Melampyrum pratense*) aan. Harvey zag verse dassenprenten op een pad. Onze weg vervolgens langs akkertjes onder meer Slofhak (*Anthoxanthum aristatum*) en Grote windhalm (*Apera spica-venti*). Aan en in een aardige sloot noteerden we Wilde bertram (*Achillea ptarmica*), Kruipend zenegroen (*Ajuga reptans*), Slanke waterweegbree (*Alisma lanceolatum*) en Puntkroos (*Lemna trisulca*). Ook vermeldenswaard waren Zeegroene ganzenvoet (*Oxybasis glauca*)-die bij ons zelden wordt gezien-, massaal bij een mesthoop; enkele exemplaren Ruwe iep (*Ulmus glabra*) in een oude singel (mogelijk wild?) en in een zandige berm een plant Kruldistel (*Carduus crispus*). In totaal 175 soorten, waarvan 23 nieuw voor het hok. (Otto Zijlstra)

