

Excursieverslag Zeesserbosch bij Ommen (228-503), 17 mei 2025 (Otto Zijlstra)

Deelnemers: Ruud Kuipers, Pieter Stolwijk, Otto Zijlstra

Binnen kilometerhok 228-503, O van Ommen, is driekwart van de oppervlakte gemengd loof- en naaldbos op zand. Vanaf de Beerzerweg loopt de Junnerweg vanuit de uiterste zuidwesthoek van het hok door dit bos oostwaarts naar Junne. Hier startte de excursie; de bermen aan weerszijden van de Junnerweg volgden we zo'n 900 meter lang. Het viel niet tegen, zo noteerden we onder meer Kruipend zenegroen (*Ajuga reptans*), Tormentil (*Potentilla erecta*), Blauwe bosbes (*Vaccinium myrtillus*), Grote muur (*Stellaria holostea*), Gewone salomonszegel (*Polygonatum multiflorum*); op greppeltaluds Stijf en Dicht havikskruid (*Hieracium* sect. *Tridentata* en sect. *Vulgata*), Dubbelloof (*Struthiopteris spicant*) en als bijzonderheid een 15-tal planten Echte guldenroede (*Solidago virgaurea*). Ook bijzonder was het terugvinden aan de Dieselweg van een grote, oude plant Geschubde mannetjesvaren (*Dryopteris affinis*), die zich vrij eenvoudig tot ondersoort *borreri* liet determineren. Muursla (*Mycelis muralis*) was hier een leuke bijvangst. Hierna wandelden we richting het centrale deel van het hok, waar zich een ca. 500 bij 200 meter grote open (stuif)zandvlakte bevindt. Ter plekke zagen we meteen te verwachten soorten als Buntgras (*Corynephorus canescens*), Zandzegge (*Carex arenaria*), Heidespurrie (*Spergula morisonii*) en Klein tasjeskruid (*Teesdalia nudicaulis*). Een verdwaasd



Pauwoogpijlstaart



Geschubde mannetjesvaren

rondfladderende Pauwoogpijlstaart (*Smerinthus ocellata*) was voor een ieder van ons de eerste ontmoeting met deze grote, opvallende nachtvlinder. Op de terugweg, net over de grens met kilometerhok 227-503, bekeken we nog een moerassige strook langs een dode Vechtarm. Hier werden naast Wateraardbei (*Comarum palustre*), Zeegroene muur (*Stellaria palustris*) en Pijptorkruid (*Oenanthe fistulosa*), meerdere zeggensoorten aangetroffen: Zwarte, Scherpe, Blauwe (*Carex nigra*, *acuta* en *panicea*) en

Hazen-, Snavel- en Zompzegge (*C. leporina*, *rostrata* en *canescens*).

In totaal werden 137 taxa waargenomen in 228-503, waaronder 31 nieuwe.