

# NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR.1, FEBRUARI 1990

## Excursieverslagen FLORON-FWT 1989

P.F. Stolwijk

OELE, 29 april: 10 deelnemers. We zijn in drie groepen op pad gegaan. De bosflora was goed vertegenwoordigd.

Daarnaast vielen op: Kraailook (*Allium vineale*), Moeraskruiskruid (*Senecio paludosus*), Deens lepelblad (*Cochlearia danica*), Bronkruid (*Montia fontana*), Vlottende bies (*Scirpus fluitans*), Grote ereprijs (*Veronica persica*).

DIEPENHEIM, 13 mei: 11 deelnemers. Kleinschalig landschap en parkbos rond de watermolen van Diepenheim.

Stijf barbarakruid (*Barbarea stricta*), Grote gele dovenetel (*Lamium galeobdolon* subsp. *montanum*), Mispel (*Mespilus germanica*), Veelkleurig vergeet-me-nietje (*Myosotis discolor*), Gewone hemelsleutel (*Sedum telephium* subsp. *telephium*), Jakobskruiskruid (*Senecio jacobaea* var. *jacobaea*). Aan de Kleidijk: Zwartblauwe rapunzel (*Phyteuma nigrum*). Bij het verzamel-punt: Middelste duivekervel (*Fumaria muralis*).

DENEKAMP, KANAAL ALMELO-NORDHORN, 3 juni: 5 deelnemers. Van Denekamp (brug) tot in Duitsland en terug.

Opvallend veel zeggesoorten zijn waargenomen: Scherpe zegge (*Carex acuta*), Zompzegge (*C. curta*), Elzenzegge (*C. elongata*), Ruige zegge (*C. hirta*), Zwarte zegge (*C. nigra*), Hazezegge (*C. ovalis*), Bleke zegge (*C. pallescens*), Blauwe zegge, (*C. panicea*), Pilzegge (*C. pilulifera*), Hoge cyperzegge (*C. pseudocyperus*), IJle zegge (*C. remota*), Snavelzegge (*C. rostrata*), Geelgroene zegge (*C. tumidicarpa*), Blaaszegge (*C. vesicaria*).

POORTBULTEN, 15 juni: 15 deelnemers. Deze excursie was speciaal bedoeld als instructie voor FLORON-medewerkers.

- Het terrein van het Arboretum was weer goed voor soorten als Bleke zegge (*Carex pallescens*), Muurhavikskruid (*Hieracium murorum*), Grote keverorchis (*Listera ovata*). De Addertong (*Ophioglossum vulgatum*) liet helaas verstek gaan.
- De spoorbaan leverde (wederom) Valse kamille (*Anthemis arvensis*), Kleine leeuwebek (*Chaenorhinum minus*) en Wilde reseda (*Reseda lutea*).
- Het zgn. voetbrugbosje bleek volkomen verruigd; wel was nog aan te treffen Bochtig havikskruid (*Hieracium maculatum*), Muurhavikskruid (*H. murorum*) en een niet nader gedetermineerde Havikskruid-soort, Witte veldbies (*Luzula luzuloides*), Wegedoorn (*Rhamnus cathartica*), maar geen spoor meer van Welriekende agrimonie (*Agrimonia procera*) en Bochtige klaver (*Trifolium medium*). Deze beide soorten zijn overigens later wel op diverse plaatsen aan de spoorbaan gevonden.

MARIËNBERG, 17 juni: 2 deelnemers. Een lange excursie door zeer gevarieerd terrein.

- Beerzerveld: Lavendelheide (*Andromeda polifolia*), Zompzegge (*Carex curta*), Kleine zonnedaauw (*Drosera intermedia*), Ronde zonnedaauw (*D. rotundifolia*), Veenpluis (*Eriophorum angustifolium*), Eenarig wollegras (*E. vaginatum*), Beenbreek (*Narthecium ossifragum*), Veenbes (*Oxycoccus palustris*), Klein blaasjeskruid (*Utricularia minor*).
- (droge) hei: Buntgras (*Corynephorus canescens*), Tandjesgras (*Danthonia decumbens*), Jeneverbes (*Juniperus communis*), Borstelgras (*Nardus stricta*), Heidespurrie (*Spergula morisonii*).
- spoorlijn: Zandstruisgras (*Agrostis vinealis*), Slipbladige ooievaarsbek (*Geranium dissectum*), Kleine leeuwebek (*Chaenorhinum minus*), Kruldistel (*Carduus crispus*), Heksenmelk (*Euphorbia esula* subsp. *esula*), Kompasla (*Lactuca serriola*), Kleine teunisbloem (*Oenothera parviflora*), Wilde reseda (*Reseda lutea*), Tengere vetmuur (*Sagina apetala*), Bosbies (*Scirpus sylvaticus*), Kleverig kruiskruid (*Senecio viscosus*), Hongaarse raket (*Sisymbrium altissimum*), Gele morgenster (*Tragopogon pratense* subsp. *pratense*), Koningskaars (*Verbascum thapsus*), Driekleurig viooltje (*Viola tricolor*), Gewoon langbaardgras (*Vulpia myuros*).
- watergangen: Kalmoes (*Acorus calamus*), Lidsteng (*Hippuris vulgaris*), Gele plomp (*Nuphar lutea*), Watergentiaan (*Nymphoides peltata*), Doorgroeid fonteinkruid (*Potamogeton perfoliatus*), Pijlkruid (*Sagittaria sagittifolia*).
- fluviaatielen: Stijf barbarakruid (*Barbarea stricta*), Groot warkruid (*Cuscuta europaea*), Groot geel walstro (*Galium verum* subsp. *verum*), Kaal breukkruid (*Herniaria glabra*) (ook aan spoorbaan), Kleine bevernel (*Pimpinella saxifraga*) (ook aan spoorbaan!), Voorjaarsganzerik (*Potentilla verna*), Knolboterbloem (*Ranunculus bulbosus*), Tijm-soort (*Thymus* spec.), Liggende klaver (*Trifolium campestre*).
- diversen: Duist (*Alopecurus myosuroides*), Kweekdravik (*Bromus inermis*), Smal streepzaad (*Crepis tectorum*), Wegedoorn (*Rhamnus cathartica*), Muskuskaasjeskruid (*Malva moschata*), Grote boterbloem (*Ranunculus lingua*), Valse salie (*Teucrium scorodonia*).

EGHERIA, 24 juni: 8 deelnemers.

Behalve de bekende bosflora, Gevleugeld sterrekroos (*Callitriche stagnalis*), Tweerijige zegge (*Carex disticha*), Sterzegge (*C. echinata*), Geelgroene zegge (*C. tumidicarpa*). Het van vroeger hier bekende Fraai hertshooi (*Hypericum pulchrum*) kon helaas niet vastgesteld worden.

LOSSER, IJSBAAN, 5 augustus: 3 deelnemers. Deze excursie was bedoeld als vegetatiekundige excursie onder leiding van Fons Eysink (SBB). Zie verslag in de volgende Nieuwsbrief.

HAAKSBERGEN, LANKHEET, 2 september: 5 deelnemers. Door een misverstand omtrent het verzamelpunt zijn er twee kleine groepjes op pad gegaan.

Kleine zonnedaauw (*Drosera intermedia*), Koningsvaren (*Osmunda regalis*) en Beenbreek (*Narthecium ossifragum*).