


Vogelmelk en Grote muur

P.F. Stolwijk

Hierbij aandacht voor twee lentebloeiers. Ze zijn in Twente niet zeldzaam, maar gaan zeker achteruit. Ze zijn voor een deel in dezelfde landschappen te vinden, met name in het oude cultuurlandschap. In het jonge ontginningslandschap zien we deze soorten niet.

Vogelmelk (*Ornithogalum umbellatum*) komt voor in de beekdalen en op de essen; vaak in bermen, (oudere) graslanden, dijktafsluitingen; ook in loofbossen, houtwallen, aan heggen en in parken. In Enschede bijvoorbeeld ook in de gazons van sommige singels. Helaas worden vele planten al voor de bloei afgemaaid, wat overigens de vegetatieve vermeerdering niet verhindert. De planten zijn al vanaf februari (het best vòòr de groei van de grassen) te ontdekken: de pollen met hun donkergroene, vlezige bladen met witte middenstreep steken duidelijk af tegen de omringende vegetatie. Verwarring met verwilderde *Crocus spec.* is mogelijk. Deze hebben echter zeer stijve, puntige, niet-vlezige bladen.



Grote muur (*Stellaria holostea*) is vooral te vinden in loofbossen; daarnaast in houtwallen, en ook op taluds in het essenlandschap. Verwarring met Akkerhoornbloem (*Cerastium arvense*) komt voor. Deze soort heeft sterk behaarde bladen; de kroonbladen zijn minder diep (tot 1/3) ingesneden. Grote muur heeft bladen die, net als de stengel, ruw zijn; de kroonbladen zijn tot op 1/2 ingesneden. Door verruiging van bermen, opruiming van houtwallen, scheuren van graslanden gaan veel groeiplaatsen van deze soorten verloren.